



**Investigación
Gestalt**
SANTIAGO 2019
IV Congreso Internacional de Investigación
en Psicoterapia Gestalt

**MAYO
29,30,31**

JUN 1°

SANTIAGO
CHILE

Gabriela Mungía y Ebert Carrillo. México

Escala de Bloqueos Gestálticos Castanedo-Munguía

El objetivo de este estudio fue analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Bloqueos Castanedo-Munguía que mide: Desensibilización, Proyección, Introyección, Retroflexión, Deflexión y Confluencia recurriendo a los procedimientos estadísticos de estudio de la fiabilidad y demostrar la asociación de bloqueos gestálticos y psicopatología. Tanto en población Peruana como en Mexicana. Participantes: La muestra estaba compuesta por 712 personas, con una edad promedio de 28.49 (DT=11); el rango era de 17 a 73 años al momento de contestar la escala. Con respecto al sexo 55.5% varones (n=395) y mujeres 44.5% (n=317), La mayoría solteros (n=332; 60.7%). La muestra se tomo de dos países México y Perú. Instrumentos: Sympton Checklist SCL-90 Escala de Bloqueos Gestálticos Castanedo Munguía Procedimiento: Se utiliza validación de 89 jueces terapeutas con un promedio de 7 años de ejercicio de 21 centros diferentes de entrenamiento se retiran los ítems con una coincidencia inferior al 80%. La aplicación se realizó en conjunto con SCL-90 para validez discriminante Resultados La escala presenta un coeficiente alpha de 0.95 tanto en población mexicana, como en población peruana. Presenta una correlación altamente significativa entre cada bloqueo y la sintomatología psicopatológica medida con SCL-90 $r=.75$; $p<0.01$. Por lo que es una escala que cumple con los requisitos psicométricos para medir el constructo de bloqueos gestálticos. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la muestra de México y la muestra de Perú siendo más alto en la población mexicana en el bloqueo desensibilización que en la peruana $t(710) = 2.47$; $p<0.05$. En Proyección (M=6.14; DT=5.08) $t(710) = 2.18$; $p<0.05$. y en Retroflexión (M=5.8; DT=5.87) $t(710) = 2.00$; $p<0.05$. Discusión Se confirma el supuesto teórico que a mayor cantidad de bloqueos, más rigidez y por tanto más neurosis, ya que se encuentra una correlación directa entre los bloqueos gestálticos y síntomas psicopatológicos.